

衛生局 2025 年 1 月 9 日消息

衛生局接獲 1 例輸入性瘧疾病例通報

衛生局昨（8）日接獲鏡湖醫院通報 1 例輸入性瘧疾病例報告，具體如下：

患者為 49 歲男性，外地僱員，約 3 個月前由非洲來澳，1 月 8 日因寒顫，小便頻繁及茶色尿，患者自行到鏡湖醫院就醫；血液樣本發現瘧原蟲環狀體，診斷為瘧疾，目前病情一般。

衛生局根據患者旅遊史、出現症狀時間及實驗室檢測結果，列為輸入性瘧疾病例，這是本澳今年錄得首例輸入性瘧疾病例。

瘧疾是一種可致命的嚴重傳染病，由瘧原蟲屬的寄生蟲引致，分為間日瘧、惡性瘧、卵形瘧及三日瘧 4 種瘧疾類型。人的感染是經由受感染的雌性瘧蚊（按蚊）叮咬傳播，雖然不會在人與人之間直接傳播，但可透過輸入受污染的血液或血液製成品、器官移植、共用刺針或針筒傳播，亦可於懷孕或分娩時由母親傳染胎兒或初生嬰兒。

衛生局指出，不同致病瘧原蟲種類的潛伏期各有不同，通常在被受感染的瘧蚊叮咬 7 至 30 日後發病，個別患者潛伏期可達數月，甚至更長時間；病徵包括間歇性發熱、發冷、冒汗、頭痛、疲倦及肌肉疼痛等徵狀；併發症包括貧血、肝腎衰竭、痙攣、神志不清及昏迷，若不及早醫治，可引致死亡。目前，藥物可有效治療瘧疾，早期診斷和治療對徹底治癒瘧疾尤為重要。

由於瘧蚊（按蚊）的孳生地例如：池塘、沼澤、溪流等在本澳少見，因此瘧蚊在本澳不常見，在本澳感染和傳播瘧疾的風險低。而瘧疾多見於氣候溫暖的地區，例如非洲、東南亞及南美洲等熱帶及亞熱帶地區。衛生局呼籲居民前往瘧疾流行地區時應採取防蚊措施，有需要時使用預防藥物，預防瘧疾方法如下：

- 1、採取有效防蚊措施避免蚊叮咬；
- 2、目前沒有預防瘧疾的疫苗，前往瘧疾流行地區，應採取防蚊措施及在需要時獲取預防性藥物；而這些藥物須在出發前服用，在旅程中亦要持續服用，直至離開該地區後的 4 個星期；

3、外遊期間或回澳後若出現疑似瘧疾病徵，應立即就診並告知醫生曾到訪的地方；

4、孕婦儘量避免前往瘧疾流行地區。

若有疑問可致電衛生局傳染病熱線（28700800）或瀏覽衛生局傳染病網頁（<http://www.ssm.gov.mo/csr/>）。