

衛生局 2025 年 3 月 10 日消息

## 衛生局關注全球麻疹流行 呼籲無免疫力者儘快接種疫苗

衛生局持續密切監察全球麻疹流行情況。近期，美國多州爆發麻疹疫情，菲律賓、越南等國家也因麻疹疫苗接種率偏低，致使麻疹個案不斷。目前，本澳雖非麻疹流行地區，但存在麻疹輸入風險。衛生局呼籲未有麻疹免疫力的居民，尤其是計劃外遊前往流行地區的，出行前務必確保完成麻疹疫苗接種。

根據美國疾病控制與預防中心（CDC）3 月 6 日的最新數據，此次美國麻疹疫情已錄得 222 宗個案，其中 94% 為未接種疫苗或接種史不詳者，近 80% 的患者是兒童及青少年。此次疫情中，已有 1 名未接種疫苗的兒童不幸死亡，另有 1 名未接種疫苗的成人在死後被發現感染麻疹病毒，死因仍在調查。

麻疹傳染性極高，未接種疫苗或未感染者很容易被傳染，而接種麻疹疫苗是預防感染、降低麻疹傳播風險的最有效方式。衛生局呼籲 1970 年或之後出生且未有麻疹免疫力的居民，前往流行地區前應確保已完成麻疹疫苗接種。居民可在一戶通（我的健康→健康紀錄→疫苗紀錄）查閱個人疫苗接種紀錄，也可向所屬衛生中心及衛生站查詢。

有接種需求的人士，本澳居民和已獲准在本澳長期逗留的非澳門居民（如外僱、學生等），可通過預約（網址為 <https://www.ssm.gov.mo/mmrss>）在衛生中心或衛生站安排接種；非上述澳門居民及其他人士，則可自行前往本澳私人醫療機構查詢接種事宜。

麻疹是一種具有高度傳染性的疾病，可透過空氣、飛沫或直接接觸患者的鼻咽分泌物而傳播。潛伏期通常為 7 至 18 天，可長達 21 天；出疹前後 4 天具傳染性；以高熱（38°C 以上）、口腔粘膜斑（Koplik 斑）、全身性的皮膚斑丘疹、結膜炎、咳嗽和流涕等表現為特徵。成人感染麻疹後多數情況較輕，但若與未具免疫力的人士接觸，尤其是抵抗力較弱的人士、孕婦及未滿一歲的兒童，則極可能將病毒傳播給他們。兒童一旦感染，更可出現中耳炎、腦炎和肺炎等併發症，嚴重情況下更可導致聽力障礙、智力障礙，甚至死亡。

為保護自己和子女的健康，居民及家長應遵照衛生局之建議，採取以下預防措施：

1. 接種疫苗是預防感染麻疹最有效的方法，18 歲以下人士應在滿 1 歲後至少接種 2 劑含預防麻疹的疫苗才完全免疫，常規建議於第 12 及 18 月齡各接種 1 劑含 MMR 疫苗；
2. 在 1970 年後出生的 18 歲或以上人士如未罹患過麻疹且未曾在滿 1 歲後接種相關疫苗，亦應補種 1 劑，尤其是負責照顧嬰幼兒的人士，如家務助理、託兒所員工；而醫護人員屬高風險人群，建議接種 2 劑；
3. 未有麻疹免疫力孕婦、兒童應避免外遊或到旅客聚集的地方；
4. 注意呼吸道禮儀，未洗手前勿觸摸眼、鼻、口；
5. 免疫力低下者避免前往人多擠迫的地方或醫療場所；
6. 如出現高熱、全身皮疹及結膜炎等疑似症狀，應戴上口罩並及時就醫。

## 麻疹傳染性極強

1970年或之後出生未曾患過麻疹  
且未曾接種疫苗者應儘快接種

近期全球各地麻疹個案上升，澳門輸入風險持續增加。

### 認識麻疹

- 可透過空氣、飛沫或直接接觸患者的鼻咽分泌物而傳播；
- 接觸後通常**7至18天**發病，但可**長達21天**；
- 出疹前後**4天**具傳染性；
- 初期會出現發熱、咳嗽、流鼻涕、眼紅或口腔內出現小白斑；
- 發熱後第3天出現從面部擴散到全身的紅色斑丘疹；
- 大部分為輕症，但**兒童感染**可出現**中耳炎、腦炎、肺炎**等併發症，甚至死亡。



接種疫苗  
是預防麻疹的最有效方法

掃描QR code查看更多疫苗資訊  
或瀏覽[www.ssm.gov.mo/vaccine](http://www.ssm.gov.mo/vaccine)



澳門特別行政區政府衛生局  
Serviços de Saúde do Governo da Região Administrativa Especial de Macau

製圖日期：2024.3.28

# 麻疹傳染性極強

1970年或之後出生未曾患過麻疹  
且未曾接種疫苗者應儘快接種

## 接種建議

對象	建議
 18歲以下人士	在滿1歲後接種2劑含麻疹疫苗， 常規建議於12及18月齡各接種1 劑MMR疫苗。
 1970年或之後 出生的18歲 或以上人士	若未曾患過麻疹且未曾在滿1歲後 接種含麻疹疫苗，應補種1劑 MMR疫苗。
 醫務人員	若未曾患過麻疹且未曾在滿1歲 後接種含麻疹疫苗，應補種2 劑MMR疫苗。

 1970年前出生的人士，絕大部份已感染或接觸過麻疹病毒並已有自然免疫力，無需補種麻疹疫苗。

如需接種，請向所屬衛生中心或衛生站查詢。

掃描QR code查看更多疫苗資訊  
或瀏覽 [www.ssm.gov.mo/vaccine](http://www.ssm.gov.mo/vaccine)



# 麻疹傳染性極強

1970年或之後出生未曾患過麻疹  
且未曾接種疫苗者應儘快接種

## 預防方法

確保已按澳門防疫接種計劃在滿1歲後  
已接種麻疹疫苗；



未有麻疹免疫力的孕婦、兒童應避免外  
遊或到旅客聚集的地方；

注意呼吸道禮儀，未洗手前勿觸摸眼、  
鼻、口；



免疫力低者避免往人多擠迫或醫療  
場所；

出現高熱、全身皮疹及眼紅等疑似症狀，  
應戴上口罩並及時就醫。



掃描QR code查看更多疫苗資訊  
或瀏覽 [www.ssm.gov.mo/vaccine](http://www.ssm.gov.mo/vaccine)



澳門特別行政區政府衛生局  
Serviços de Saúde do Governo da Região Administrativa Especial de Macau

製圖日期：2024.3.28