

衛生局 2025 年 3 月 23 日消息

麻疹疫苗需兩週產生保護 無免疫力者外遊前應提早接種

隨著清明節及復活節公眾假期臨近，預計有不少居民會外出掃墓或旅遊，因應近期全球各地麻疹個案呈現不同程度的上升，衛生局特別提醒計劃前往流行地區的居民注意防範，尚未具備麻疹免疫力人士應提前至少兩週完成麻疹疫苗接種；並呼籲未完成兩劑麻疹疫苗接種的兒童及不具免疫力的孕婦避免前往麻疹流行地區，以降低感染風險。

根據世界衛生組織的最新資料，部分國家因兒童疫苗接種率偏低而導致麻疹流行加劇，2024 年歐洲與中亞地區共通報超過 12.7 萬宗麻疹病例，是自 1997 年以來的最高紀錄，4 成以上的病例為 5 歲以下兒童，超過一半的病例需要住院治療，截至 2025 年 3 月 6 日上述國家地區已報告 38 宗麻疹相關死亡病例；此外，美國及加拿大近期麻疹流行亦持續升溫，今年錄得的個案數已超過去年全年水平，大多數患者均未接種疫苗或接種記錄不詳；越南、菲律賓等國家因疫苗接種率偏低，麻疹個案亦持續增加。

目前，本澳雖非麻疹流行地區，但作為旅遊城市，仍存在麻疹輸入及傳播的風險。衛生局強調，接種麻疹疫苗是預防感染及減少麻疹傳播最有效的方法，呼籲未接種疫苗的兒童及不具免疫力的孕婦避免前往麻疹流行地區，1970 年或之後出生且未具免疫力的居民，在前往流行地區前應確保已完成疫苗接種，具體建議如下：

- 18 歲以下居民應在滿 1 歲後至少接種 2 劑含預防麻疹的疫苗才完全免疫，常規建議於第 12 及 18 月齡各接種 1 劑含 MMR 疫苗；
- 18 歲或以上一般居民應接種 1 劑 MMR 疫苗；
- 居民可在一戶通(我的健康→健康紀錄→疫苗紀錄)查閱個人疫苗接種紀錄，也可向所屬衛生中心及衛生站查詢。

有接種需求的人士，包括本澳居民及已獲准在本澳長期逗留的非澳門居民（如外僱、學生等），可通過預約（網址為 <https://www.ssm.gov.mo/mmrrs>）在衛生

中心或衛生站安排接種；非上述澳門居民及其他人士，則可自行前往本澳私人醫療機構查詢接種事宜。

衛生局提醒居民如在外遊期間或回澳後出現發熱、全身皮疹及眼紅等疑似麻疹症狀，應儘快就醫並告知醫護人員詳細旅遊史及接觸史。

麻疹傳染性極強

1970年或之後出生未曾患過麻疹
且未曾接種疫苗者應儘快接種

近期全球各地麻疹個案上升，澳門輸入風險持續增加。

認識麻疹

- 可透過空氣、飛沫或直接接觸患者的鼻咽分泌物而傳播；
- 接觸後通常**7至18天**發病，但可**長達21天**；
- 出疹前後**4天**具**傳染性**；
- 初期會出現發熱、咳嗽、流鼻涕、眼紅或口腔內出現小白斑；
- 發熱後第3天出現從面部擴散到全身的紅色斑丘疹；
- 大部分為輕症，但**兒童感染**可出現**中耳炎、腦炎、肺炎**等併發症，甚至死亡。



接種疫苗
是預防麻疹的最有效方法

掃描QR code查看更多疫苗資訊
或瀏覽www.ssm.gov.mo/vaccine



麻疹傳染性極強

1970年或之後出生未曾患過麻疹
且未曾接種疫苗者應儘快接種

接種建議

對象	建議
 18歲以下人士	在滿1歲後接種2劑含麻疹疫苗， 常規建議於12及18月齡各接種1 劑MMR疫苗。
 1970年或之後 出生的18歲 或以上人士	若未曾患過麻疹且未曾在滿1歲後 接種含麻疹疫苗，應補種1劑 MMR疫苗。
 醫務人員	若未曾患過麻疹且未曾在滿1歲 後接種含麻疹疫苗，應補種2 劑MMR疫苗。

 1970年前出生的人士，絕大部份已感染或接觸過麻疹病毒並已有自然免疫力，無需補種麻疹疫苗。



如需接種，請向所屬衛生中心或衛生站查詢。

掃描QR code查看更多疫苗資訊
或瀏覽 www.ssm.gov.mo/vaccine



麻疹傳染性極強

1970年或之後出生未曾患過麻疹
且未曾接種疫苗者應儘快接種

預防方法

確保已按澳門防疫接種計劃在滿1歲後
已接種麻疹疫苗；



未有麻疹免疫力的孕婦、兒童應避免外
遊或到旅客聚集的地方；

注意呼吸道禮儀，未洗手前勿觸摸眼、
鼻、口；



免疫力低者避免往人多擠迫或醫療
場所；

出現高熱、全身皮疹及眼紅等疑似症狀，
應戴上口罩並及時就醫。



掃描QR code查看更多疫苗資訊
或瀏覽 www.ssm.gov.mo/vaccine



澳門特別行政區政府衛生局
Serviços de Saúde do Governo da Região Administrativa Especial de Macau

製圖日期：2024.3.28