澳門特別行政區政府 Governo da Região Administrativa Especial de Macau 衛生局 Serviços de Saúde	疾病預防及控制中心 Centro de Prevenção e Controlo de Doenças	文件號碼：	007.CDC-DPC.GL.2024
		版本：	02
		生效日期：	2024.04.03
		更新日期：	2026.03.23
		下次審查日期：	2028.03.23
	技術指引	停用日期：	----------
		頁數：	1/1

本澳居民麻疹疫苗接種情況及接種需要一覽表

查閱最新版本（按此進入）

出生年份	麻疹流行及接種情況	免疫情況及接種需要
1970 年前	疾病廣泛流行，絕大多數已自然感染。	不必再接種。
1970 至 1982 年	在 9 個月齡接種 1 劑，接種率低，自然感染仍然常見。	若在滿 1 歲後未接種過且未自然感染，可到衛生中心或衛生站接種 1 劑。
1983 至 1989 年	若在本澳完成正規教育小學，則一般在 9 個月齡至小六期間已合共接種 1 至 4 劑疫苗並至少有 1 劑在滿 1 歲後。此群居民接種率很高。	絕大多數有免疫力，不必接種。若在滿 1 歲後未接種過且未自然感染，可到衛生中心或衛生站接種 1 劑。
1990 至 2001 年	若在本澳完成正規教育小學，則一般已在 9 和 15 個月齡及小學 1 年級接種合共接種 2 至 3 劑疫苗。此群居民接種率很高。	絕大多數有免疫力，不必接種。若在滿 1 歲後未接種過且未自然感染，可到衛生中心或衛生站接種 1 劑。
2002 年或之後出生	一般已在 12 和 18 個月齡各接種 1 劑。接種率很高。完成 2 劑接種程序後絕大多數有免疫力。	若已按接種計劃接種，不必再接種。18 歲以下未曾在滿 1 歲後接種 2 劑者、18 歲及以上在滿 1 歲後未接種過 1 劑且未自然感染者，可到衛生中心或衛生站補種。