

SITUAÇÃO DA INFECCÃO POR VIH/SIDA EM MACAU

Estatística Trimestral de VIH/SIDA

(Abril – Junho, 2007)

No segundo trimestre de 2007, foram detectadas 6 novas infecções por VIH, sendo todas em indivíduos do sexo masculino. Três eram residentes locais, nos quais não foi possível determinar a via de transmissão devido a informação insuficiente.

Os restantes 3 casos foram detectados em indivíduos não residentes, 2 dos quais adquiriram a infecção pela via heterossexual e num caso não foi possível determinar a via de transmissão. Neste trimestre foram declarados 4 casos de SIDA. (Tabela 1)

Cumulativamente, desde 1986 até Junho de 2007, o número total de casos de infecção por VIH, detectados em Macau, foi de 378, dos quais 53.7% eram residentes temporários ligados à indústria de diversões; 39 dos doentes infectados pelo VIH evoluíram para SIDA. A principal via de transmissão foi a sexual (67.5%), correspondendo 59.5% à transmissão heterossexual e 7.9% à transmissão homossexual. A transmissão pela utilização de drogas injectáveis representou 13.8% das novas infecções.

Tabela 1 – RESUMO DA ESTATÍSTICA TRIMESTRAL
2^o TRIMESTRE (Abril – Junho, 2007)

	Ano 2007 (Abr. - Jun.)		Ano 2006 (Jan. - Dez.)		Cumulativo (1986 – Jun. 2007)	
	VIH	SIDA	VIH	SIDA	VIH	SIDA
SEXO						
Masculino	6	4	20	2	167	32
Feminino	0	0	8	0	210	7
Desconhecido	0	0	0	0	1	0
ETNIA/RACA						
Chinesa	1	2	15	1	90	22
Não Chinesa	5	2	12	1	267	17
Desconhecida	0	0	1	0	21	0
IDADE						
Adulta	6	4	28	2	368	38
Criança (13 anos ou menos)	0	0	0	0	2	1
Desconhecida	0	0	0	0	8	0
VIA DE TRANSMISSÃO						
Heterossexual	2	1	11	1	225	14
Homossexual	0	0	4	0	30	6
Drogas Injectáveis	0	0	8	0	52	5
Transf. Sangue/prod. Deriv.	0	0	0	0	1*	0
Perinatal	0	0	0	0	1	1
Desconhecida	4	3	5	1	69	13
TOTAL	6	4	28	2	378	39

*Infectado via transfusão de sangue fora de Macau.

VIH: Vírus da Imunodeficiência Humana

SIDA: Síndrome da Imunodeficiência Adquirida

Fonte: Laboratório de Saúde Pública dos Serviços de Saúde, Governo da RAEM