

SITUAÇÃO DA INFEÇÃO POR VIH/SIDA EM MACAU

Estatística Trimestral de VIH/SIDA (Janeiro – Março 2006)

No primeiro trimestre de 2006, foram detectadas 7 infecções por VIH, das quais 4 em indivíduos do sexo masculino e 3 do sexo feminino; 1 era residente local, utilizador de drogas injectáveis; os restantes 6 eram residentes temporários, dos quais 3 adquiriram a infecção pela via heterossexual e 3 pela utilização de drogas injectáveis. (tabela 1)

Neste trimestre, a infecção em utilizadores de drogas injectáveis representou 57% das novas infecções, demonstrando, uma vez mais, que a propagação no grupo de toxicodependentes continua a crescer, representando uma situação preocupante.

Cumulativamente, desde 1986 até final de Março de 2006, o número total de casos de infecção por VIH, detectados em Macau, foi de 346, dos quais 56.6% eram residentes temporários ligados à indústria de diversões; 33 dos doentes infectados pelo VIH evoluíram para SIDA. A principal via de transmissão foi a sexual (68.2%), com predominância da transmissão heterossexual (60.7%), seguida da transmissão através da utilização de drogas injectáveis (13.0%) e da transmissão homossexual (7.5%).

**Tabela 1 – RESUMO DA ESTATÍSTICA TRIMESTRAL
1º TRIMESTRE (Janeiro – Março 2006)**

| | Ano 2006 (Jan.-Mar.) | | Ano 2005 (Jan.-Dez.) | | Cumulativo (1986-Mar. 2006) | |
|------------------------------------|-------------------------|----------|-------------------------|----------|--------------------------------|-----------|
| | VIH | SIDA | VIH | SIDA | VIH | SIDA |
| SEXO | | | | | | |
| Masculino | 4 | 0 | 17 | 3 | 141 | 26 |
| Feminino | 3 | 0 | 6 | 0 | 204 | 7 |
| Desconhecido | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ETNIA/RAÇA | | | | | | |
| Chinesa | 3 | 0 | 12 | 3 | 74 | 19 |
| Não Chinesa | 4 | 0 | 11 | 0 | 252 | 14 |
| Desconhecida | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| IDADE | | | | | | |
| Adulta | 7 | 0 | 23 | 3 | 336 | 32 |
| Criança (13 anos ou menos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Desconhecida | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| VIA DE TRANSMISSÃO | | | | | | |
| Heterossexual | 3 | 0 | 9 | 0 | 210 | 12 |
| Homossexual | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 6 |
| Drogas Injectáveis | 4 | 0 | 10 | 1 | 45 | 5 |
| Transf. Sangue/prod. Deriv. Sangue | 0 | 0 | 0 | 0 | 1* | 0 |
| Perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Desconhecida | 0 | 0 | 3 | 1 | 63 | 9 |
| TOTAL | 7 | 0 | 23 | 3 | 346 | 33 |

*Infectado via transfusão de sangue fora de Macau.

VIH: Vírus da Imunodeficiência Humana

SIDA: Síndrome da Imunodeficiência Adquirida

Fonte: Laboratório de Saúde Pública dos Serviços de Saúde

Tabela 2 – CASOS DECLARADOS DE VIH/SIDA EM 2005

| | VIH | SIDA |
|------------------------------|-----------|----------|
| SEXO | | |
| Masculino | 17 | 3 |
| Feminino | 6 | 0 |
| Desconhecido | 0 | 0 |
| ETNIA/RAÇA | | |
| Chinesa | 12 | 3 |
| Não Chinesa | 11 | 0 |
| Desconhecida | 0 | 0 |
| IDADE | | |
| Adulta | 23 | 3 |
| Criança (13 anos ou menos) | 0 | 0 |
| Desconhecida | 0 | 0 |
| VIA DE TRANSMISSÃO | | |
| Heterossexual | 9 | 0 |
| Homossexual | 1 | 1 |
| Drogas Injectáveis | 10 | 1 |
| Transf. Sangue/prod. Deriv. | 0 | 0 |
| Perinatal | 0 | 0 |
| Desconhecida | 3 | 1 |
| TOTAL | 23 | 3 |