

SITUAÇÃO DA INFECCÃO POR VIH/SIDA EM MACAU

Estatística Trimestral de VIH/SIDA

(Abril – Junho 2006)

No segundo trimestre de 2006, foram detectadas 4 infecções por VIH, o corrente todas em indivíduos do sexo masculino e das quais um evoluiu para SIDA. Dois eram residentes locais, tendo um adquirido a infecção pela via homossexual e o outro era utilizador de drogas injectáveis. Os outros dois eram residentes temporários cuja via de transmissão da infecção não foi determinada devido a inadequada informação (tabela 1).

Cumulativamente, desde 1986 até final de Junho de 2006, o número total de casos de infecção por VIH, detectados em Macau foi de 350, dos quais 56.0% em residentes temporários ligados à indústria de diversões; 34 dos doentes infectados pelo VIH evoluíram para SIDA. A principal via de transmissão foi a sexual (67.7%), com predominância da transmissão heterossexual (60.0%), seguida da transmissão através da utilização de drogas injectáveis (13.1%) e da transmissão homossexual (7.7%).

Tabela 1 – RESUMO DA ESTATÍSTICA TRIMESTRAL
2º TRIMESTRE (Abril – Junho, 2006)

	Ano 2006 (Abr. - Jun.)		Ano 2005 (Jan. - Dez.)		Cumulativo (1986 - Jun. 2006)	
	VIH	SIDA	VIH	SIDA	VIH	SIDA
SEXO						
Masculino	4	1	17	3	145	27
Feminino	0	0	6	0	204	7
Desconhecido	0	0	0	0	1	0
ETNIA/RAÇA						
Chinesa	3	0	12	3	77	19
Não Chinesa	1	1	11	0	253	15
Desconhecida	0	0	0	0	20	0
IDADE						
Adulta	4	1	23	3	340	33
Criança (13 anos ou menos)	0	0	0	0	2	1
Desconhecida	0	0	0	0	8	0
VIA DE TRANSMISSÃO						
Heterossexual	0	0	9	0	210	12
Homossexual	1	0	1	1	27	6
Drogas Injectáveis	1	0	10	1	46	5
Transf. Sangue/prod. Deriv.	0	0	0	0	0	0
Perinatal	0	0	0	0	1	1
Desconhecida	2	1	3	1	65	10
TOTAL	4	1	23	3	350	34

*Infectado via transfusão de sangue fora de Macau.

VIH: Vírus da Imunodeficiência Humana

SIDA: Síndrome da Imunodeficiência Adquirida

Fonte: Laboratório de Saúde Pública dos Serviços de Saúde