



Recomendações gerais sobre o número e o intervalo entre as vacinas contra a Covid-19 administradas por cada grupo etário

Data de revisão: 2023/05/01

Grupo etário	Se tem doenças crónicas Nota ²	Nº de doses do esquema vacinal primário recomendado Nota ³	Intervalo do esquema vacinal primário (a contar da administração da última dose da vacina)	N.º de doses de reforço da vacina recomendado	Intervalo de reforço da vacinação (a contar da administração da última dose da vacina)		Reforço extraordinário da vacinação (Vacina bivalente de mRNA)	Intervalo de reforço extraordinário da vacinação
					1.ª dose de reforço da vacina Nota ⁴	2.ª dose de reforço da vacina		
Seis meses a quatro anos de idade	Não	Inactivada: 2 doses mRNA: 3 doses	Inactivada: 4 semanas mRNA: 8 semanas	Não é necessário	-	-	Não é necessário	-
	Sim							
5 anos a 11 anos de idade	Não	2 doses	4 semanas	1 dose	6 meses	-	Não é necessário	-
	Sim							
12 anos a 17 anos de idade	Não	2 doses	4 semanas	1 dose	6 meses	-	Não é necessário	-
	Sim							
18 anos a 59 anos de idade	Não	2 doses	4 semanas	1 dose	6 meses	-	É necessário vacinar os indivíduos que tenham concluído todas as doses de reforço da vacina, mas que não tenham administrado a vacina bivalente de mRNA	6 meses
	Sim							
Idade igual ou superior a 60 anos	Não	2 doses	4 semanas	2 doses	3 meses	3 meses	É necessário vacinar os indivíduos que tenham concluído todas as doses de reforço da vacina, mas que não tenham administrado a vacina bivalente de mRNA	6 meses
	Sim							
Grávidas (que completaram 16 semanas de gestação)	A vacinação é efectuada de acordo com o grupo etário						As grávidas que tenham completado todas as doses de reforço da vacina, é necessário inocular uma dose adicional da vacina bivalente de mRNA durante o período de gravidez	6 meses

Profissionais da linha da frente <small>Nota 1</small>	A vacinação é efectuada de acordo com o grupo etário	É necessário vacinar os indivíduos que tenham concluído todas as doses de reforço da vacina, mas que não tenham administrado a vacina bivalente de mRNA	6 meses
<p>Nota1 : Incluindo médicos e enfermeiros da linha da frente, pessoal de apoio em instituições médicas (como administrativos da área hospitalar, guardas de segurança, trabalhadores de limpeza, entre outros), trabalhadores de lares de idosos e trabalhadores de laboratórios que lidam com o novo coronavírus.</p> <p>Nota2 : Incluindo indivíduos com doenças crónicas, como cancro, doenças crónicas do sistema circulatório, doenças crónicas do aparelho respiratório, doenças crónicas hepáticas, doenças crónicas renais, doenças crónicas metabólicas, doenças crónicas hematológicas, indivíduos com o sistema imunológico comprometido ou indivíduos obesos com outras doenças crónicas, incluindo os obesos de BMI(kg/m²) ≥30. Inibidores da imunidade de grau moderado ou grave.</p> <p>Nota 3 : Para os indivíduos com idade igual ou superior a cinco anos e inibidores da imunidade de grau moderado ou grave, é-lhes recomendado que seja administrada uma dose adicional, por um período igual ou superior a 28 dias contar da administração da 2.^a dose da vacina de mRNA ou a vacina inactivada. Para servir como uma extensão do esquema vacinal primário, ou seja, é necessário mais uma dose da vacina do que as pessoas normais para produzir mais anticorpos.</p> <p>Nota 4: Em caso de necessidade urgente, pode ser administrada a 1.^a dose de reforço da vacina com a antecedência de três meses (12 semanas) ou mais em relação à conclusão do esquema vacinal primário, e os postos de vacinação não necessitam de lhes exigir a apresentação do documento comprovativo do motivo justificativo. No entanto, é necessário assinar o pedido de vacinação antecipada da 3.^a dose (ou dose de reforço) e o termo de consentimento informado. Por enquanto, não serão aceites os pedidos de vacinação antecipada de outras doses de reforço.</p>			