



各年齡組的新冠疫苗接種劑數及間隔的一般建議

(更新日期: 2024.02.01)

年齡	曾接種不含 XBB 變異株成份新冠疫苗	含 XBB 變異株成份的疫苗 (包括 XBB 單價 mRNA 疫苗) ^{註 1}	
		建議劑數	建議最短間隔 ^{註 2}
5 歲或以上	1 劑或以上	1 劑	離上一劑相隔至少 3 個月
	0 劑	1 劑	-
6 個月至 4 歲	2 劑或以上	1 劑	離上一劑相隔至少 3 個月
	1 劑	2 劑	<ul style="list-style-type: none">● 第 1 劑：離上一劑相隔至少 3 個月● 第 2 劑：離第 1 劑 XBB 疫苗相隔至少 8 週
	0 劑	3 劑	<ul style="list-style-type: none">● 即時接種第 1 劑● 第 2 劑：離第 1 劑 XBB 疫苗相隔至少 8 週接種，中至重度免疫抑制的人士可縮短至相隔至少 3 週● 第 3 劑：離第 2 劑 XBB 疫苗相隔至少 8 週接種

註1：已接種其他獲准授權使用的含 XBB 變異株成份的疫苗，視為已接種 XBB 單價 mRNA 疫苗。

註2：對於曾接種不含 XBB 變異株成份的新冠疫苗或曾感染新冠病毒者，建議離上次接種或感染相隔至少3個月接種（以較晚者為準），暫不接受提早接種。