



澳門特別行政區政府  
Governho da Região Administrativa Especial de Macau  
衛生局  
Serviços de Saúde

## 各年齡組的新冠疫苗接种劑數及間隔的一般建議

(更新日期: 2024.11.27)

年齡	曾接種非 JN.1 變異株成分的新冠疫苗	含 JN.1 變異株成分的疫苗 (包括 JN.1 單價 mRNA 疫苗) <sup>註1</sup>	
		建議劑數	建議最短間隔 <sup>註2</sup>
5 歲或以上	1 劑或以上	1 劑	離上一劑相隔至少 3 個月 (12 週)
	0 劑	1 劑	-
6 個月至 4 歲	2 劑或以上	1 劑	離上一劑相隔至少 3 個月 (12 週)
	1 劑	2 劑	<ul style="list-style-type: none"><li>● 第 1 劑: 離上一劑相隔至少 3 個月 (12 週)</li><li>● 第 2 劑: 離第 1 劑 JN.1 疫苗相隔至少 8 週 (56 天)</li></ul>
	0 劑	3 劑	<ul style="list-style-type: none"><li>● 即時接種第 1 劑</li><li>● 第 2 劑: 離第 1 劑 JN.1 單價 mRNA 疫苗相隔至少 8 週 (56 天) 接種, 中至重度免疫抑制的人士可縮短至相隔至少 3 週 (21 天)</li><li>● 第 3 劑: 離第 2 劑 JN.1 單價 mRNA 疫苗相隔至少 8 週 (56 天) 接種</li></ul>

註1: 已接種其他獲准授權使用的含 JN.1 變異株成分的疫苗, 視為已接種 JN.1 單價 mRNA 疫苗。  
含 KP.2 變異株成分的疫苗等同含 JN.1 變異株成分的疫苗。

註2: 對於近期曾接種非 JN.1 變異株成分的新冠疫苗或感染新冠病毒者, 建議離上次接種或感染相隔至少 3 個月接種 (以較晚者為準), 暫不接受提早接種。