



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa
Especial de Macau
衛生局
Serviços de Saúde

疾病預防及控制中心
技術指引
Orientações técnicas do
Centro de Prevenção e
Controlo e Doenças

編號：009.CDC.PERE.GL2022
版本：3.0
制作日期：2022.07.29
修改日期：2022.08.01
頁數：1/2

本地疫情防控穩定期工作場所減少傳播風險的措施

- 1 本指引適用於本地疫情防控穩定期繼續運作的工作場所，除一般性指引外，場所還需要遵守落實本指引的要求，以及倘有的為特定場所訂定的其他指引。
- 2 在疫情防控穩定期內，場所運作時對服務安排和工作人員管理應特別遵守以下措施：
 - 2.1 鼓勵線上提供服務；在線下提供的服務，應採取預約或取籌等方式，避免太多接受服務的人士在現場等候聚集；
 - 2.2 監督確保員工遵守當局各項既定的防疫要求，包括核酸檢測和抗原檢測（如有要求），以及各項減少聚集的措施；上述檢測在不超過 3 天的休假期間亦不可中斷；
 - 2.3 監督確保員工留意自身和同住者的健康狀況，有新冠病毒感染疑似症狀，或健康碼為紅碼者，或未按當局要求接受倘有的核酸檢測和抗原檢測者，不可上班及進入場所；
 - 2.4 工作人員上班期間及下班在家居以外地方活動時，除飲食及其他例外情況外應時刻戴好外科口罩或以上標準的口罩；
 - 2.5 工作人員接待人數較多且有條件時，除口罩外，還應戴上面屏（或稱面盾 face shield）；
 - 2.6 錯峰上下班，電梯內人多時應等候下一部電梯，乘公共交通工具及乘電梯時均應戴好口罩；
 - 2.7 鼓勵員工用電單車、私家車、的士等非巴士的交通工具，如有條件，避免使用大眾交通工具；使用公司員工巴士，應儘可能開窗及隔行坐；
 - 2.8 上班期間和下班後都不可聚集，在家居以外期間，進食等不能戴口罩的活動期間應在單人單間進行；沒有條件安排單人單間進行者，則應使用擋板（高於桌面 50 厘米）或在屏風高於桌面 50 厘米單人間隔內進行，且應儘可能減少同一時間內同一空間內進食的人數；在沒有遮擋的情況下不可面對面共餐。在室外工作地點如建築工地，也可安排在室外同一地方進食，但各人之間應相隔至少 1 米以上；
 - 2.9 維持社會運作的關鍵基礎設施，為減少感染風險，可考慮分組上班，組間成員不見面；



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa
Especial de Macau
衛生局
Serviços de Saúde

疾病預防及控制中心
技術指引

Orientações técnicas do
Centro de Prevenção e
Controlo e Doenças

編號：009.CDC.PERE.GL2022

版本：3.0

制作日期：2022.07.29

修改日期：2022.08.01

頁數：2/2

本地疫情防控穩定期工作場所減少傳播風險的措施

- 2.10 工作人員工作地點儘可能固定，應和設施內其他工作人員儘可能分不同的區域休息、飲食，以及避免面對面飲食。
- 3 下列場所在運作時，須要求顧客/服務使用者提供採樣日起計 3 日內（即接受服務當日或過去 2 天內採樣）的核酸檢測採樣證明或陰性結果證明：
- 3.1 餐廳、飲食場所、飲料場所或其他向在場顧客/服務使用者提供餐飲的場所；
 - 3.2 電影院、劇院、室內遊樂場、遊戲機及電子遊戲室、網吧、桌球室、保齡球場、蒸氣浴室、按摩院、美容院、健身院、健康俱樂部、“卡拉 OK”場所、酒吧、夜總會、的士高、舞廳、歌舞廳及向公眾開放的泳池；
 - 3.3 補習社、培訓中心、訓練中心及室內體育場所等需要長時間面對面授課、培訓或逗留的機構；
 - 3.4 托兒所、長者或康復日間中心等服務使用者會長時間逗留的社會服務設施（由社會工作局具體訂定）。
- 4 場所對外服務安排
- 4.1 進入場所的顧客，健康碼必須不是紅碼，體溫正常；
 - 4.2 儘可能控制進場人數，避免場所內過於擁擠；
 - 4.3 不提供會引起聚集的促銷活動。
- 5 工作團隊、工作空間內有任何人出現病毒核酸檢測陽性個案，該陽性個案曾到過場所，有關場所應暫停運作，有關人員應留在原地，直至收到當局的指示；等候期間工作人員應根據風險分開不同的空間等候，並戴好口罩。倘場所無法暫停運作，例如基本服務機構，應採取各項減少傳播風險的嚴格措施，包括要求工作人員每天接受抗原和核酸檢測。

澳門特別行政區政府衛生局
疾病預防及控制中心